

ردیف	نام و شکل دارو (تعداد)	دوزاژ	موارد مصرف	توضیحات
۱	آب مقطر (۱۰)	5ml	رقیق کردن داروها	
۲	ایپی نفرین (۱۰)	1mg/10cc (1/1000)	ایست قلبی شامل ریتم های آسیستول، VF&VT، PEA	بزرگسالان: 1mg هر ۳-۵ دقیقه اطفال: 0/01 mg/kg (0/1 ml/kg)
		1mg/1 cc (1/1000)	در درمان شوک آنافیلاکسی، آسم	بزرگسالان: 0/3-0/5 mg (۳۰-۵۰ واحد سرنگ انسولین) عضلانی و تکرار در صورت نیاز هر ۱۵-۲۰ دقیقه اطفال: 0/01mg/kg و حداکثر تا 0/3mg و تکرار در صورت نیاز هر ۵-۱۰ دقیقه
۳	آتروپین (۵)	0/5mg/ml	برادی کاردی های علامت دار با علائم افت GCS، درد قفسه سینه، هایپوپرفیوژن، افت BP	بزرگسالان: 0/5mg و تکرار هر ۳-۵ دقیقه تا حداکثر 3mg اطفال: 0/02mg/kg و در صورت نیاز تکرار ۳-۵ دقیقه بعد تا حداکثر 1mg آنتی دوت آن نتوستیگمین
			آنتی دوت ارگانو فسفرها	با توجه به پاسخ درمانی و برطرف شدن علائم مسمومیت
۴	آمیودارون (۵)	50mg/ml (150mg/3ml)	دیس ریتمی های بطنی کشنده مانند VF& pVT	بزرگسالان: نوبت اول 300mg و نوبت دوم 150mg اطفال: 5mg/kg و حداکثر دو بار تکرار (نوبت اول پس از شوک سوم و نوبت دوم پس از شوک پنجم)
۵	لیدوکائین ۲٪ (۵)	20mg/ml (100mg/5ml)	آنتی دیس ریتمی در VF&pVT	بزرگسالان: 1-1/5mg/kg و پس از ۵-۱۰ دقیقه 0/5-0/75mg/kg تا سقف دوز 3mg/kg اطفال: 1mg/kg تا سقف دوز 100mg آنتی دوت آن سدیم بیکربنات
۶	آدنوزین (۳)	3mg/ml	دیس ریتمی در PSVT	6mg در ۱-۳ ثانیه و ۲۰ سی سی سرم نرمال سالین بلوس شود و در صورت عدم پاسخ تکرار ۱-۲ دقیقه بعد 12mg تا سقف دوز 30mg

۷	نیتروگلیسرین (۳)	(5mg/5ml 10mg/5ml)	واژودیلاتور (گشادکنندگی عروق) در درمان بحران هایپر تنشن و آنژین صدری	منع مصرف در فشار سیستولیک کمتر از 90mmHg
۸	دوپامین (۳)	200mg/5ml	اینوتروپیک و کرونوتروپیک قلبی	وابسته به دوز: دوز پایین: 2-5 mc/kg/min جهت افزایش پرفیوژن کلیه دوز متوسط: 5-10mc/kg/min جهت افزایش برون ده قلب و فشار خون دوز بالا: بیشتر از 10mc/kg/min جهت افزایش فشار خون و نبض (واژوکانتستریکشن)
۹	دوبوتامین (۳)	12.5 mg/ml, 20 ml	اینوتروپیک قلبی ، در کاهش CO	دوز 20mc/kg/min ارجحیت بر دوپامین در بیماران با مشکلات عروق کرونر
۱۰	هپارین (۳)	5000 U/ml	آنتی کوآگولانت	پروفیلاکسی پس از سکت قلبی آنتی دوت آن پروتامین سولفات
۱۱	وراپامیل (۳)	2.5 mg/ml, 2ml	ضد آنژین و آنتی هایپر تنشن دیس ریتمی PSVT	
۱۲	دیگوکسین (۳)	0.25 mg/ml, 2 ml	دسته دارویی: گلیکوزید قلبی نارسایی قلبی و فیبریلاسیون دهلیزی	ممنوعیت در هایپوکالمی عارضه ی مسمومیت دیگوکسین (بی اشتها، درد شکم و تهوع و استفراغ) مدنظر باشد آنتی دوت آن لیدوکائین
۱۳	لابتالول (۳)	5 mg/ml,	هایپرتانسیون بارداری	
۱۴	فورماید (۱۰)	10 mg/ml	ادم، هایپرتانسیون، ادم حاد ریوی، افزایش ICP، هایپوکالمی، هایپرمنیزمی	
۱۵	نالوکسان (۱۰)	0.4 mg/ml	آنتی دوت مخدرها	رقیق شده با دوزهای 0.1mg هم برای کودکان و هم بزرگسالان (تادوز نهایی 0.4mg) و سپس با دوزهای 0.4mg تا دوز نهایی (2mgIV) یا IM(در بیمارانشالمنند با مشکل قلبی با احتیاط
۱۶	میدازولام (۳)	5 mg/ml	بنزودیازپین در صرع های مقاوم به درمان، سداسیون قبل عمل	
۱۷	لورازپام (۶)	2 mg/ml	بنزودیازپین در صرع های مقاوم به درمان، ضد تشنج	داروی یخچالی
۱۸	فنی توئین (۵)	50 mg/ml	ضد صرع و ضد تشنج	ناسازگاری با سرم های قندی

آنتی دوت آن سدیم بیکربنات	ضدصرع، صرع مقاوم، ضد تشنج	200 mg/ml	فنوباریتال (۵)	۱۹
در صورت ایجاد عارضه تزریق بای پریدین	ضدسایکوز	5 mg/ml	هالوپریدول (۳)	۲۰
	هایپوکسمی و هایپرکالمی، آنتی دوت منیزیوم سولفات و پتاسیم کلراید	100 mg/ml, 10 ml	کلسیم گلوکونات (۳)	۲۱
	واکنش های آلرژیک	50 mg/ml,	دیفن هیدرامین (۲)	۲۲
	شوک آنافیلاکسی	50 mg/ml, 2ml	هیدروکورتیزون (۳)	۲۳
عوارض اکستراپیرامیدال مدنظر باشد آنتی دوت آن بای پریدین	ضدتھوع	5 mg/ml	متوکلورامید (۳)	۲۴
	H2 بلاکر استفاده در پپتیک اولسر	25mg/ml	رانیتیدین (۳)	۲۵
مورد استفاده در کد ۲۴۷	ضدتجمع پلاکتی	100 mg	آسپرین جویدین (۱۰)	۲۶
مورد استفاده در کد ۲۴۷	ضدتجمع پلاکتی	75 ml	کلوپییدوگرل (۲۰)	۲۷
مهم ترین عارضه سردرد و با شرط فشار سیستولیک بیشتر از ۹۰	ضداثرین، کاهنده فشارخون	0.4 mg	پرل نیتروگلیسرین (۱۰)	۲۸
باید به ضربان قلب، برون ادراری و رفلکس های تاندون عمقی توجه شود. برون ده ادراری باید بیشتر از 50cc/h باشد.	اکلامپسی و هایپوکالمی	50 ml	سولفات منیزیم ۵۰ درصد (۲)	۲۹
استفاده از بزرگترین ورید محیطی	کربوهیدرات در هایپوگلیسمی	50 ml	دکستروز ۲۰ و ۵۰ درصد (هرکدام ۳)	۳۰
در CPR بطور روتین استفاده نمی شود.	اسیدوز متابولیک و هایپرکالمی و مسمومیت با داروهای TCA	50 ml	سدیم بیکربنات ۷/۵ یا ۸/۴ درصد (۳)	۳۱
	هایپوناترمی شدید	50 ml	سدیم کلراید ۵ درصد (۱)	۳۲
در حملات آسم مورد استفاده قرار می گیرد.	برونکودیلاتور	100 mcg/dose	سالبوتامول (۱)	۳۳
	هایپوگلیسمی	500ml	دکستروز ۵ درصد (۱)	۳۴
	هایپوتشن	500ml	سدیم کلراید ۰/۹ درصد (۱)	۳۵